

Patientenname _____

Aufklärung und Einwilligung zur Wurzelspitzenresektion an Zahn: _____

Operationsablauf:

Dieser Eingriff wird in örtlicher Betäubung durchgeführt. Durch einen Schleimhautschnitt wird nach der örtlichen Betäubung der über der Wurzelspitze befindliche Knochen freigelegt und mit dem Bohrer abgetragen. Dann wird die Wurzelspitze gekürzt und das entzündliche Gewebe entfernt. Die Wurzelkanäle werden (wenn nicht bereits geschehen) mit einer Wurzelfüllung gefüllt. Anschließend wird die Wunde vernäht..

Mögliche Behandlungsfolgen:

Nach dem Eingriff ist regelmäßig die Verkehrstüchtigkeit wegen des Betäubungsmittels für einige Stunden eingeschränkt. Fahrzeuge dürfen nicht gefahren und Maschinen nicht bedient werden. Nach der Operation kommt es im Bereich des Operationsgebietes für einige Tage zu unterschiedlich starken Schwellungen und Schmerzen. Die Mundöffnung, die Ernährungs-, Gefühls-, Geschmacks- und Sprechfähigkeit und die Motorik des Gesichts können eingeschränkt sein. Bei allen Eingriffen in der Mundhöhle können Nachblutungen, Wundheilungsstörungen (Entzündungen) sowie Verletzungen bzw. Schäden durch die Injektion für die örtliche Betäubung und den unvermeidlichen Zug des Halteinstrumentes und den Gebrauch anderer Instrumente an Zunge, Lippen, Schleimhaut, Nerven, Kiefer, Nachbarzähnen und Kronen auftreten. Außerdem können in ganz seltenen Fällen trotz größter Vorsicht Instrumententeile oder andere Fremdkörper in der Wunde verbleiben. Dieses kann gleichzeitig oder später ergänzende operative Maßnahmen nötig machen. Sehr selten liegen Kronenränder nach dem Eingriff frei. Sehr selten müssen solche Kronen erneuert werden. Auch sehr selten muss der Eingriff wegen vorher nicht zu erkennender Ausdehnung der Erkrankung erweitert werden; z.B. kann doch im gleichen Eingriff eine Entfernung des Zahnes nötig werden, wenn sich bei der Operation herausstellt, dass ein Wurzellängsbruch vorliegt. Selten ist der Nachbarzahn mitbetroffen und muss auch reseziert werden. Extrem selten sind Verbrennungen an der Lippe durch heißlaufende Handstücke. Nach der Operation kommt es bei manchen Patienten zur Ausbildung von kleinen Schleimhautgeschwüren in der Umgebung der Wunde (sog. Stressaphten). Sehr selten entwickelt sich ein Herpes.

-Bei einer Operation von Seitenzähnen im Oberkiefer kann es zu einer Eröffnung der Kieferhöhle kommen, die durch einen besonders dichten Wundverschluss behoben wird. Selten folgt eine akute Kieferhöhlenentzündung. Extrem selten entsteht eine bleibende Gefühlsstörung im Gaumen- oder Wangenbereich. Nach der Eröffnung der Kieferhöhle darf man sich 14 Tage lang nicht schneuzen, weil sonst durch den Überdruck in der Nase, der sich in die Kieferhöhle fortpflanzt, die Wunde aufgeblasen würde. Das kann manchmal zur Entstehung eines Fistelgangs und einer akuten oder chronischen Kieferhöhlenentzündung und/oder Schmerzen führen.

-Bei einer Operation von Zähnen im Unterkiefer können der Unterkiefer- und/oder der Zungennerv beeinträchtigt werden mit der Folge dauernder oder vorübergehender Gefühls- und/oder Geschmacksstörungen und/oder Schmerzen.

Bitte fragen Sie uns, wenn Sie weitere Einzelheiten über die Behandlung oder mögliche Komplikationen wissen möchten.

Ich erkläre mich mit dem geplanten Eingriff einverstanden. Frau/Herr Dr. _____ hat mir die Notwendigkeit, Ablauf und mögliche Folgen / Risiken des Eingriffs im Einzelnen dargelegt. Soweit sich während der Durchführung des geplanten Eingriffs zwangsläufig Änderungen oder Erweiterungen ergeben sollten, bin ich auch damit einverstanden. Ich hatte Gelegenheit, vor der Operation alle mich interessierenden Fragen, speziell auch zu möglichen Behandlungsfolgen, zu klären. Wenn Sie entferntes Material behalten wollen, sagen Sie es uns bitte dem Eingriff. Ich weiß auch, dass ich meine Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile widerrufen kann.

Bemerkungen des Arztes: _____ Datum: _____

Unterschrift des aufklärenden Arzt/Zahnarzt: _____

Unterschrift des Patienten bzw. des Sorgeberechtigten: _____